

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MEDICAMENTO EN LA ETIQUETA

TYLENOL® EXTRA STRENGTH Caplets

**TYLENOL**  
Acetaminophen

## Ingrediente activo

Un ingrediente activo es el compuesto químico del medicamento que provee el efecto terapéutico. Siempre aparece como el primer elemento en la etiqueta. En los EE.UU., el paracetamol por lo general tiene la designación de acetaminofén.

## Indicaciones

Aquí se indica la dosis diaria recomendada y la frecuencia de las dosis. Debes seguir estas indicaciones estrictamente. No sólo es importante cuánto tomas sino también con qué frecuencia.

## Ingredientes inactivos

Los ingredientes inactivos son compuestos químicos en el medicamento necesarios para la formulación del producto. Incluyen colores (tintes), sabores, conservantes, lubricantes y aglutinantes.

### Drug Facts

Active ingredient (in each caplet)	Purpose
Acetaminophen 500 mg	Pain reliever/fever reducer

**Uses** temporarily relieves minor aches and pains due to:

- headache
- muscular aches
- backache
- arthritis
- the common cold
- toothache
- menstrual cramps
- temporarily reduces fever

### Warnings

**Alcohol warning:** If you consume 3 or more alcoholic drinks every day, ask your doctor whether you should take acetaminophen or other pain relievers/fever reducers. Acetaminophen may cause liver damage.

### Do not use

- with any other product containing acetaminophen

### Stop use and ask doctor if:

- new symptoms occur
- redness or swelling is present
- pain gets worse or lasts for more than 10 days
- fever gets worse or lasts for more than 3 days

**If pregnant or breast-feeding,** ask a health professional before use.

### Keep out of reach of children.

**Overdose warning:** Taking more than the recommended dose (overdose) may cause liver damage. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Quick medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.

### Directions

- **do not take more than directed (see overdose warning)**

adults and children 12 years and over	■ take 2 caplets every 4 to 6 hours
children under 12 years	do not use this adult Extra Strength product in children under 12 years of age; this will provide more than the recommended dose (overdose) of TYLENOL® and may cause liver damage

### Other information

- **do not use if pouch is opened**
- store between 20-25°C (68-77°F)
- see end panel for lot number and expiration date

### Inactive ingredients

carnauba wax, castor oil, cellulose, corn starch, FD&C red #40, hypromellose, magnesium stearate, sodium starch glycolate, titanium dioxide

### Questions or comments?

Call toll-free 1-877-895-3665 (English) or 1-888-466-8746 (Spanish).

## Usos

Esta sección explica los síntomas para los que el medicamento ha sido aprobado.

## Advertencias

Esta sección indica qué otros medicamentos o circunstancias se deben evitar mientras tomas este medicamento.

## Otra información

Esta sección incluye cualquier otra información importante sobre el producto, por ejemplo, cómo guardarlo.

**Recuerda: esta es información de importancia que debes comprender. Si no comprendes esta etiqueta, consulta con tu médico o farmacéutico, o visita [www.tylenoespanol.com](http://www.tylenoespanol.com) o llama gratis al 1-888-466-8746.**

