





TYLENOL® Información profesional sobre la dosis para niños y bebés

Nota: Si es posible, usa el peso para buscar la dosis; de lo contrario, usa la edad. Para encontrar la dosis correcta, pesa a tu niño antes de darle TYLENOL®. **Se debe consultar a un médico sobre la dosis para niños menores de dos años.**

Siéntete bien,
TYLENOL
ACETAMINOFÉN

Consulta siempre a tu médico sobre qué producto es el correcto para tu niño.

| Edad | Peso y edad de tu niño | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | de 0 a 3 meses | de 4 a 11 meses | de 12 a 23 meses | de 2 a 3 años | de 4 a 5 años | de 6 a 8 años | de 9 a 10 años | 11 años | 12 años |
| | de 6 a 11 lbs | de 12 a 17 lbs | de 18 a 23 lbs | de 24 a 35 lbs | de 36 a 47 lbs | de 48 a 59 lbs | de 60 a 71 lbs | de 72 a 95 lbs | 95 lbs en adelante |
|  Concentrated TYLENOL® Infants' Drops Cherry, Grape & Cherry dye-free flavors Ingrediente Activo: Acetaminofén 80 mg (en cada 0.8 ml) Usar según las indicaciones. | 0.4 ml | 0.8 ml | 1.2 ml (0.8 ml + 0.4 ml) | 1.6 ml (0.8 ml + 0.8 ml) | — | — | — | — | — |
|  Children's TYLENOL® Suspension Cherry Blast, Very Berry Strawberry, Bubblegum Yum, Grape Splash & Cherry dye-free flavors Ingrediente activo: Acetaminofén 160 mg (en cada 5 ml o 1 ctda.) Usar según las indicaciones. | — | — | — | 1 ctda. o 5 ml | 1 1/2 cdtas. o 7.5 ml | 2 cdtas. o 10 ml | 2 1/2 cdtas. o 12.5 ml | 3 cdtas. o 15 ml | — |
|  Children's TYLENOL® Meltaway Tablets Bubblegum Burst, Wacky Watermelon & Grape Punch flavors Ingrediente activo: Acetaminofén 80 mg (en cada tableta) Usar según las indicaciones. | — | — | — | 2 tabletas | 3 tabletas | 4 tabletas | 5 tabletas | 6 tabletas | — |
|  Jr. TYLENOL® Meltaway Tablets Bubblegum Burst & Grape Punch flavors Ingrediente activo: Acetaminofén 160 mg (en cada tableta) Usar según las indicaciones. | — | — | — | — | — | 2 tabletas | 2 1/2 tabletas | 3 tabletas | 4 tabletas |

cdta. = cucharadita*

Instrucciones importantes para el uso adecuado

- **Lee y sigue las instrucciones de la etiqueta de todos los productos TYLENOL®**
 - Tomar cada 4 horas, según sea necesario
 - No exceder más de 5 dosis en 24 horas
- **NO usar con ningún otro producto que contenga acetaminofén**
- **Mantén todos los medicamentos fuera del alcance de los niños**
- **NO administres medicamentos de adultos a niños**
- ***Usa únicamente el dosificador que viene con el producto específico**
- Concentrated TYLENOL® Infants' Drops son más concentradas que Children's TYLENOL® Liquids. Las gotas concentradas para bebés (Concentrated Infants' Drops) se han diseñado específicamente para usarse sólo con el gotero provisto.
- Children's TYLENOL® Liquids son menos concentrados que Concentrated TYLENOL® Infants' Drops. Children's TYLENOL® Liquids se han diseñado específicamente para usarse sólo con el gotero provisto.
- Children's TYLENOL® Meltaway Tablets no tienen la misma concentración que Jr. Strength TYLENOL® Meltaway Tablets. Jr. TYLENOL® Meltaway Tablets contienen 160 mg de acetaminofén y Children's TYLENOL® Meltaway Tablets contienen 80 mg de acetaminofén.
- **Si tienes alguna pregunta, comunícate con tu médico, o llama al 1-877-895-3665**

Tomar cada 4 horas, según sea necesario. No exceder más de 5 dosis en 24 horas.

MOTRIN® Información profesional sobre la dosis para niños y bebés

Nota: Si es posible, usa el peso para buscar la dosis; de lo contrario, usa la edad. Para encontrar la dosis correcta, pesa a tu niño antes de darle MOTRIN®. **Se debe consultar a un médico sobre la dosis para niños menores de seis meses.**

Motrin^{IB}
Ibuprofeno

Consulta siempre a tu médico sobre qué producto es el correcto para tu niño.

Edad
Peso

Peso y edad de tu niño

| | de 0 a 5 meses | de 6 a 11 meses | de 12 a 23 meses | de 2 a 3 años | de 4 a 5 años | de 6 a 8 años | de 9 a 10 años | 11 años |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | de 6 a 11 lbs | de 12 a 17 lbs | de 18 a 23 lbs | de 24 a 35 lbs | de 36 a 47 lbs | de 48 a 59 lbs | de 60 a 71 lbs | de 72 a 95 lbs |
|  <p>Concentrated MOTRIN® Infants' Drops Berry & Berry dye-free flavors Ingrediente activo: Ibuprofeno 50 mg (en cada 1.25 ml)</p> <p>Usar según las indicaciones.</p> | — | 1.25 ml | 1.875 ml | — | — | — | — | — |
|  <p>Children's MOTRIN® Suspension Berry, Grape, Tropical Punch, Bubblegum & Berry dye-free flavors Ingrediente activo: Ibuprofeno 100 mg (en cada 5 ml o 1 cdt.)</p> <p>Usar según las indicaciones.</p> | — | — | — | 1 cdt. o 5 ml | 1 1/2 cdtas. o 7.5 ml | 2 cdtas. o 10 ml | 2 1/2 cdtas. o 12.5 ml | 3 cdtas. o 15 ml |
|  <p>MOTRIN® Junior Strength Easy-to-Swallow Caplets Ingrediente activo: Ibuprofeno 100 mg (en cada capleta)</p> <p>Usar según las indicaciones.</p> | — | — | — | — | — | 2 capletas | 2 1/2 capletas | 3 capletas |
|  <p>MOTRIN® Junior Strength Chewable Caplets Orange & Grape flavors Ingrediente activo: Ibuprofeno 100 mg (en cada tableta)</p> <p>Usar según las indicaciones.</p> | — | — | — | 1 tableta | 1 1/2 tabletas | 2 tabletas | 2 1/2 tabletas | 3 tabletas |

cdta. = cucharadita*

Tomar cada 6 a 8 horas, según sea necesario. No exceder más de 4 dosis en 24 horas.

Instrucciones importantes para el uso adecuado

- **Lee y sigue las instrucciones de la etiqueta de todos los productos MOTRIN®**
 - Tomar cada 6 a 8 horas, según sea necesario
 - No exceder más de 4 dosis en 24 horas
- **NO administrar más de 10 días, a menos que lo indique un médico**
- **Consulta a un médico o farmacéutico antes de usar este producto si el niño está tomando cualquier otro medicamento con AINE (con o sin receta médica)**
 - MOTRIN® contiene ibuprofeno

- **Mantén todos los medicamentos fuera del alcance de los niños**
- ***Usa únicamente el dosificador que viene con el producto específico**
 - Los utensilios caseros, como las cucharas de medidas, son menos precisos
- **NO administres medicamentos de adultos a niños**
- Concentrated MOTRIN® Infants' Drops son más concentradas que Children's MOTRIN® Liquids. Las gotas concentradas para bebés (Concentrated Infants' Drops) se han diseñado específicamente para usarse sólo con el dosificador provisto.

- Children's MOTRIN® Liquids son menos concentrados que Concentrated MOTRIN® Infants' Drops. Children's MOTRIN® Liquids se han diseñado específicamente para usarse sólo con el dosificador provisto.
- Dosis de venta libre: la dosis recomendada es de 7.5mg/kg cada 6 a 8 horas. La dosis diaria recomendada es 30 mg/kg.
- **Si tienes alguna pregunta, comunícate con tu médico, o llama al 1-877-895-3665**