

您的寶寶感到疼痛或發燒時，您對於如何給藥可能會有疑問 — 尤其是如果這是第一次。最重要的是務必每次都閱讀並遵照標籤指示 — 如此才不會給予過多的藥物或給藥過於頻繁。這些步驟能幫助您在給予嬰兒 TYLENOL® 時更有信心。

步驟 1 — 洽詢醫生

在給予不滿 2 歲的寶寶服用嬰兒 TYLENOL® 之前，務必洽詢醫生應給予多少劑量。正確劑量是根據寶寶當時的體重和年齡來計算，所以下次您給予嬰兒 TYLENOL® 時應洽詢醫生最新的正確劑量。

建議： 如果您致電醫生辦公室詢問正確的劑量，請備妥藥瓶在手中。

步驟 2 — 量測正確用量

務必使用包裝盒內所附的 SimpleMeasure® 注射器。



僅限依指示服用。

-  1. 推擠出注射器內的空氣
-  2. 把注射器尖端插入瓶口
-  3. 將瓶子翻轉倒立
-  4. 把注射器內的黃色部分拉至正確劑量的位置

建議： 每次用畢都把 SimpleMeasure® 注射器和嬰兒 TYLENOL® 放回原包裝盒內。勿使用不同的量測工具來服用本藥物。

步驟 3 — 餵食藥物

- 抱著寶寶保持直立。
- 慢慢地把口服液注入孩子口中至臉頰內側。

建議： 如果寶寶吐出部分藥物，就不要餵食更多！
等到下一劑的服用時間再餵食。

幫助不願吃藥的寶寶服藥要領

- 如果您的寶寶會把藥吐出來，在餵食口服液時可輕壓其雙頰，如此將使寶寶張開嘴巴且不容易吐出來。
- 如果您的寶寶不喜歡藥味，可在服藥後給予較好喝的飲料。(較大的寶寶可在服藥前舔一舔冰棒或其他冰冷食物，使舌頭略微失去知覺。)



下載免費的兒童保健追蹤工具

追蹤孩子的身高、體重、身體質量指數 (BMI)、疫苗接種、症狀和藥物，並且計算劑量。

保健常識是由 McNEIL-PPC 公司 (McNEIL-PPC, Inc.) 的 McNeil 消費者保健部門所提供，McNEIL-PPC 公司是兒童 TYLENOL® 和兒童 MOTRIN® 的製造商。



App Store 是蘋果公司 (Apple Inc.) 的服務商標，Google Play 是谷歌公司 (Google Inc.) 的商標，會依標準下載費率收費。