

알아 두세요...

## 자녀를 위한 진통제/해열제 투여 방법

진통제는 해열 및 가벼운 통증을 완화합니다. 어린이용으로 승인받은 진통제는 아세트아미노펜(어린이용 TYLENOL®의 성분) 및 이부프로펜(어린이용 MOTRIN®의 성분) 2종류입니다. 그러나 아스피린은 라이증후군이라는 심각한 질병을 초래할 수 있으므로, 어린이에게 주어서는 안 됩니다.

미국에서는 흔히 처방전 없이도 진통제를 구입하여 사용할 수 있습니다. 하지만 모든 약물은 올바르게 사용하지 않을 경우 위험할 수 있습니다. 다음은 어린이용 진통제를 항상 안전하게 사용하는 방법입니다.



### 적정 용량을 숙지하세요.

아이들은 빨리 자라므로 현재 체중(체중을 모를 경우에는 나이)에 맞는 용량을 라벨에서 투여 시마다 확인하는 것이 중요합니다. 유아의 경우에는 의사에게 정확한 용량을 문의하라고 라벨에 표시되어 있을 수 있습니다. 자녀가 두 명 이상 있는 가정에서는 자녀들의 나이별로 다른 용량을 혼동하는 상황이 발생할 수도 있습니다.

### 정확하게 측정하세요.

정확한 측정을 위해서는 해당 약품과 함께 포장된 용량 도구만을 사용하십시오. 일반적으로, 유아용 제품에는 용량 측정용 주사기가, 어린이용 제품에는 작은 컵이 함께 제공됩니다.

### 두 번째 복용분을 너무 빨리 주지 마세요.

라벨을 확인하여 복용 주기를 숙지하십시오. 두 번째 복용을 너무 빨리 하면 자녀에게 위험할 수 있습니다.

## 어린이용 진통제에 대한 중요한 사실

- **성인용 약품은 소량이라도 어린이에게 주지 마세요.**
- **약 라벨을 항상 읽고 따르세요.**
- **동일한 활성성분이 들어 있는 약은 두 가지 이상 투여하지 마세요.** 하루에 두 가지 이상의 약을 자녀에게 주는 경우, 모든 약 라벨의 "활성성분표"를 확인하십시오. 많은 경우, 일반의약품 및 처방약(종합기침감기약 포함)에는 TYLENOL®의 활성성분인 아세트아미노펜 뿐만 아니라 안티히스타민, 기침 억제제 등 기타 성분이 들어 있습니다.

**참조:** 일부 라벨에는 아세트아미노펜이 "APAP"라는 약어로 표시되기도 합니다.



## 무료 Kids' Wellness Tracker 다운받기

자녀의 신장, 체중, BMI, 백신, 증상, 약을 기록하고 투여량을 계산합니다.

McNEIL-PPC, Inc.의 McNeil 소비자 의료서비스부가 제공하는 건강 요령, Children's TYLENOL® 및 Children's MOTRIN® 제조사



App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Google Play는 Google Inc.의 상표입니다. 표준 다운로드 요금이 적용될 수 있습니다.

©McNEIL-PPC, Inc. 2013 MHP-006K